

REANIMATION - BASISMASSNAHMEN

BEWUSSTLOSER / LEBLOSER PATIENT



An den Schultern schütteln
laut Namen rufen,
ggf. Schmerzreiz setzen



ATMUNG PRÜFEN

KEINE normale Atmung
Wiederbelebung starten
100 - 120 / Min. - 30:2
30 Kompressionen - 2 Beatmungen

Hilfe holen
112
DEFI holen

NORMALE Atmung
(hörbar, fühlbar, sichtbar)
Kinn überstrecken/anheben
Stabile Seitenlage

Im Zweifel keine Seitenlage
und Beginn Wiederbelebung!
Ständig überprüfen!

Seitenlage nur dann, wenn wirklich eine
normale Atmung vorliegt.
Keine Verzögerung der Herzdruckmassage!

DEFI VERFÜGBAR

- Einschalten
- Elektroden aufkleben
- Anweisungen befolgen

Schock empfohlen?

JA

NEIN

**Wiederbelebung
fortführen 30 : 2**
Lebenszeichen?

GUTE HERZDRUCKMASSAGE:

- Handballen mittig auf Brust
- Mind. 5, max. 6cm tief (Tennisball)
- Vollständig entlasten
- 100 - 120 x pro Minute
- 30 Kompressionen, 2 Beatmungen
 - im Zweifel NUR Kompressionen
- sich alle 2 Minuten abwechseln

Anweisungen befolgen
Während Schock Patienten nicht
berühren